

# Vaccination contre la COVID-19

---



Bourgogne Franche-Comté

# OBJECTIF

---

## Actualiser le timing du schéma vaccinal :

- de la primo-vaccination selon le vaccin utilisé,
- des doses de rappel 1 & 2,
- en ajustant sur l'ATCD d'infection COVID.

# Documents de référence

---

- Avis n°2022.0043/AC/SESPEV du 13 juillet 2022 du Collège de la Haute Autorité de santé relatif à la place d'une dose de rappel supplémentaire des vaccins contre la Covid-19 dans la stratégie vaccinale
- DGS-URGENT N°2022\_67 du 20 juillet 2022 : deuxième rappel vaccinal contre le COVID-19 : élargissement de l'éligibilité et maintien de la mobilisation pendant la période estivale
- Avis n°2022.0044/AC/SESPEV du 21 juillet 2022 du collège de la Haute Autorité de santé relatif à l'obligation de vaccination contre la Covid-19 des professionnels des secteurs sanitaire et médico-social

# Schéma vaccinal

---

Primo-  
vaccination  
et 1<sup>er</sup> rappel

&

2<sup>ème</sup> rappel

# Primo-vaccination & 1<sup>er</sup> rappel avec les vaccins ARNm

PRIMO-VACCINATION (2 doses)

1<sup>er</sup> RAPPEL VACCINAL (vaccin ARNm)

- Dès 3 mois après la primo-vaccination
- Max 4 mois après

INFECTION COVID

PRIMO VACCINATION (1 dose) 2 mois après COVID

1<sup>er</sup> RAPPEL VACCINAL (vaccin ARNm)

- Dès 3 mois après la primo-vaccination
- Max 4 mois après

INFECTION COVID

PRIMO VACCINATION (2 doses)\* 2 mois après COVID

1<sup>er</sup> RAPPEL VACCINAL (vaccin ARNm)

- Dès 3 mois après la primo-vaccination
- Max 4 mois après

\*Personnes éligibles à la primo-vaccination 2 doses (DGS-Urgent n°2021-24) :

- les personnes présentant une immunodépression avérée (en particulier celles qui reçoivent un traitement immunosuppresseur)
- les personnes âgées hébergées en établissement (EHPAD, USLD)
- les personnes vaccinées avant la parution de ce DGS-Urgent

PRIMO-VACCINATION (2 doses)

INFECTION COVID après la primo-vaccination

1<sup>er</sup> RAPPEL VACCINAL (vaccin ARNm)

- Dès 3 mois après l'infection
- Max 4 mois après

PRIMO-VACCINATION INCOMPLÈTE (1 dose)

INFECTION COVID plus de 15 jours après vaccin

1<sup>er</sup> RAPPEL VACCINAL (vaccin ARNm)

- Dès 3 mois après l'infection
- Max 4 mois après

PRIMO-VACCINATION INCOMPLÈTE (1 dose)

INFECTION COVID moins de 15 jours après le vaccin


PRIMO VACCINATION (2<sup>ème</sup> dose) 2 mois après COVID

1<sup>er</sup> RAPPEL VACCINAL (vaccin ARNm)

- Dès 3 mois après l'infection
- Max 4 mois après



# Primo-vaccination & 1<sup>er</sup> rappel avec le vaccin Janssen



CALCULER LA DATE DE VOTRE RAPPEL

# 2<sup>ème</sup> rappel : stratégie selon les cibles



|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Personnes <math>\geq</math> 80 ans</li> <li>▪ Résidents EHPAD &amp; USLD</li> <li>▪ Personnes immunodéprimées</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Personnes <math>&lt;</math> 80 ans à risque de forme grave</li> <li>▪ Femme enceinte dès 1<sup>er</sup> trimestre</li> <li>▪ Personne vivant dans l'entourage des personnes vulnérables ou immunodéprimées ou dans une stratégie de cocooning</li> <li>▪ Professionnels des secteurs sanitaire et médico-social (le 2<sup>ème</sup> rappel ne rentre pas dans le champ de l'obligation vaccinale)</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                 |                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratégie selon la présence ou pas d'une infection COVID intercurrente depuis le dernier rappel | Pas d'infection COVID après le 1 <sup>er</sup> rappel | Dès 3 mois après le premier rappel                                                                    | Dès 6 mois après le premier rappel                                                                    |
|                                                                                                 | Infection COVID après le 1 <sup>er</sup> rappel       | Dès 3 mois après l'infection en respectant un délai minimal de 6 mois après le 1 <sup>er</sup> rappel | Dès 3 mois après l'infection en respectant un délai minimal de 6 mois après le 1 <sup>er</sup> rappel |