

Vous avez accepté de prendre part à cette étude et nous vous en remercions.

Votre établissement bénéficie de l'appui d'une EMHT.

En participant dans le **Groupe 1**, vous vous êtes engagé à utiliser les TROD selon les modalités définies ci-après et à prescrire l'oseltamivir dans le cadre des recommandations chaque fois que cela sera nécessaire et à remplir les différents questionnaires.

Quel est l'objectif de ce groupe ?

Le **groupe 1** permettra d'évaluer la plus-value de l'utilisation des TROD indépendamment des autres mesures de gestion des événements à potentiel épidémique, telle que l'intervention des EMHT.

Autres supports disponibles :



Site internet du CPias BFC

www.cpiasbfc.fr

- Flyer de présentation de l'étude Gripp'Impact



- Vidéo Allo Doc' Grippe (chaîne You Tube du CPias BFC)

—> question/réponse sur l'oseltamivir



<https://www.youtube.com/watch?v=CyK4UIFeDXU>

- Vidéo LES TUTOS DU CCLIN SUD-OUEST (chaîne You Tube du CPias Nouvelle Aquitaine)

—> réalisation du TROD :



https://www.youtube.com/watch?v=cFgsyNuP_mQ

Pour toutes **questions** sur l'étude, contacter le Dr C. Bouvier-Slekovec :

cslekovec@chu-besancon.fr

Gripp'Impact

Groupe 1

Accompagnement + TROD

Quelles sont les mesures les plus efficaces pour limiter l'impact des épidémies de grippe ?



Version du 21 mars 2019

Quelle conduite tenir devant une suspicion de grippe ?

Mesures barrières : mises en place sans délai


Sollicitation de votre IDEHT : pour optimiser la conduite à tenir.

TROD-Grippe : réalisé par des médecins ou des infirmiers formés et information du médecin coordonnateur.

Réalisation des TROD-grippe :

• En dehors de la période de circulation épidémique

- ◇ Dans les 48 heures suivant l'apparition des signes dès le second cas suspect
- ◇ Compte-tenu de la faible sensibilité des TROD : à réaliser sur 3 à 5 cas.



Stratégie de dépistage devant l'apparition de cas suspects de grippe en dehors d'un contexte épidémique.

• En période de circulation épidémique

le TROD peut être pratiqué dès le premier cas suspect et particulièrement en cas d'apparition de cas multiples le même jour.

Comment réaliser un TROD-Grippe ?

La qualité du prélèvement est essentielle.




Comment interpréter le résultat ?

Un résultat positif peut apparaître dès la 1ère minute.

Cependant, une lecture à 10 min est nécessaire pour confirmer un résultat négatif.

L'apparition d'une bande Test A et/ ou B quelle qu'en soit l'intensité, indique un résultat positif.

En cas d'absence de bande verte C, le test est invalide. Recommencer la procédure avec un nouveau test.



Conduite à tenir en fonction du résultat

◇ Le résultat est positif

Le virus de la grippe circule au sein de l'établissement.

➔ traitement **curatif** des cas,

➔ **préemptif** et **prophylactique** des contacts à risque selon les modalités préconisées par le HCSP.

Toutes les infos sur l'**Oseltamivir** avec la vidéo Allo'Doc : Grippe sur la chaîne YouTube du CPIas BFC.

◇ Le résultat est négatif

La sensibilité des TROD n'est pas suffisante pour exclure le diagnostic de grippe devant un test négatif. C'est pourquoi il est recommandé de réaliser un test chez 3 à 5 résidents.

La confirmation systématique du diagnostic n'est pas attendue. Si la clinique est évocatrice et/ou s'il existe une forte suspicion de grippe (période épidémique etc.), le traitement antiviral pourra être donné dans les 48 heures suivant l'apparition des premiers symptômes.

Quand remplir le questionnaire

1 questionnaire par épisode d'IRA quel que soit le nombre de personnes concernées ou la documentation de l'infection (grippe ou autre étiologie).

Dès réception du questionnaire et en cas d'utilisation d'au moins 3 TROD-Grippe, un second kit sera transmis à l'établissement afin qu'il puisse gérer un épisode ultérieur.